

**RELACIONES INTERNACIONALES****BOLETÍN *EUROPA AL DÍA*****El SIDA en la UE*****N.º 145******Año 2004***

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este Boletín *Europa al Día* sin citar la fuente o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

El SIDA en la UE

Durante el año 2003 se han diagnosticado 6441 nuevos casos de SIDA en la UE25, lo que supone un descenso con relación a años anteriores, pero existe una tendencia al alza del número de infecciones de VIH nuevas declaradas

En 2003, se declararon 6441 casos nuevos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en la UE25, es decir, un 24% menos que en el año 2002. El número de casos ha seguido disminuyendo desde 1994, cuando se diagnosticaron 25.000 casos nuevos de SIDA. Este descenso de los casos de SIDA se debe, en parte, al uso creciente del tratamiento antirretroviral desde mediados de los años noventa. Si bien el número de los nuevos diagnósticos de SIDA sigue bajando en la UE25, se observa, por otro lado, una tendencia al alza en el número de infecciones por VIH de nueva declaración.

Nuevas declaraciones de infección por VIH

Los datos epidemiológicos sobre los nuevos casos de infección por VIH reflejan con más exactitud el panorama actual que los datos sobre los casos de SIDA, sobre todo desde la aparición del tratamiento antirretroviral.

Sin embargo, los datos sobre las nuevas infecciones por VIH deben interpretarse con prudencia, ya que pueden no ser representativas de la incidencia del VIH (es decir, de nuevas infecciones) y porque dependen en gran medida de los métodos de detección precoz y de declaración del VIH, que son diferentes en cada país. Además, en algunos países la cobertura sanitaria sigue siendo incompleta y, en los países en los que los sistemas de declaración son nuevos o se han modificado, numerosos casos diagnosticados anteriormente podrían haberse declarado al implantarse el sistema, lo que provocaría que al principio se produjeran muchas declaraciones y más adelante se redujera el número.

Teniendo en cuenta todo esto, y para el conjunto de los 17 Estados miembros de los que tenemos datos disponibles, el número de infecciones por VIH declaradas por primera vez era de 7641 en 1996 y de 13.257 en 2003, es decir, un incremento del 75%.

Tasa de incidencia del SIDA de 14,2 casos por millón de habitantes en la UE25

Entre los Estados miembros, **Italia** (1759 casos nuevos de SIDA) y **España** (1363) representan cerca del 50% del conjunto de casos nuevos de SIDA diagnosticados en 2003 en la UE25.

En la UE25, la tasa de incidencia en 2003 fue de 14,2 casos nuevos por millón de habitantes. La tasa de incidencia más elevada se produjo en **Portugal** (78,6), seguida de **España** (32,8) y de **Italia** (30,6), mientras que **Eslovaquia** (0,4), la **República Checa** (0,8) e **Irlanda** (2,1) registraron las tasas más bajas.

Entre 1994 y 2003 la tasa de incidencia se ha reducido en un 25% en la UE25 (pasando de 56,3 a 14,2). En cuanto a los Estados miembros, todos los países de la UE15 registraron una bajada importante entre los años 1994 y 2003, a excepción de **Portugal**, donde la tasa de incidencia aumentó (de 68,1 a 78,6). Las bajadas más fuertes se han producido en los **Países Bajos** (de 31,8 en 1994 a 2,8 en 2001), en **Irlanda** (de 20,9 en 1994 a 2,1 en 2003), en **Francia** (de 100,1 a 11,5), **Dinamarca** (de 45,4 a 7,6), **Alemania** (de 25,4 a 4,3) y **España** (de 188,4 a 32,8).

Los nuevos Estados miembros representan menos del 5% de los nuevos casos de SIDA diagnosticados en 2003, pero en algunos países, la tasa de incidencia ha aumentado con relación a 1994, sobre todo en **Estonia** (de 0,7 a 7,4) y en **Letonia** (de 0,8 a 25), debido principalmente a que la epidemia se ha iniciado más tarde.

Infecciones por VIH, casos de SIDA y tasa de incidencia del SIDA

	Nº de casos nuevos de SIDA diagnosticados, por año de			Tasa de incidencia del SIDA (por millón de		Nº de infecciones nuevas por VIH diagnosticadas, por año de declaración	
	1994	2002	2003	1994	2003	1996	2003
UE25	25 096	8 449	6 441	56,3	14,2	7 641**	13 257*
Bélgica	259	102	87	25,6	8,4	719	1 032
República	12	8	9	1,2	0,8	50	61
Dinamarca	236	44	41	45,4	7,6	269	241
Alemania	2 068	655	353	25,4	4,3	1 967	1 823
Estonia	1	5	10	0,7	7,4	8	541
Grecia	216	90	72	20,5	6,5	449	431
España	7 390	2 009	1 363	188,4	32,8	:	:
Francia	5 765	1 578	686	100,1	11,5	:	1 714**
Irlanda	75	32	8	20,9	2,1	98	399
Italia	5 505	1 741	1 759	96,3	30,6	:	:
Letonia	2	55	58	0,8	25,0	32	403
Lituania	2	9	9	0,5	2,6	12	110
Luxemburgo	13	1	8	32,5	17,8	25	47
Hungría	23	26	26	2,2	2,6	62	63
Países Bajos	488	44****	:	31,8	2,8****	:	834****
Austria	169	66	43	21,3	5,3	:	423
Polonia	100	123	167	2,6	4,4	551	610
Portugal	680	960	818	68,1	78,6	:	2 298
Eslovenia	6	3	6	3,0	3,0	9	14
Eslovaquia	3	2	2	0,6	0,4	4	13
Finlandia	43	21	26	8,5	4,9	69	134
Suecia	187	58	52	21,4	5,8	224	382
Reino Unido	1 853	861	838	31,8	14,1	3 093	6 953

: Datos no disponibles. No hay datos de Chipre y Malta.

* Datos corregidos de los retrasos de declaración.

** El total UE25 se refiere únicamente a los 17 Estados miembros sobre los que se tienen datos disponibles tanto de 1996 como de 2003.

*** Datos de marzo a diciembre de 2003.

**** 2001

Aumento de la transmisión por contactos heterosexuales

Por lo que respecta a las vías de transmisión, un poco más del 40% del total de casos de SIDA nuevos en 2003 en la UE25 se deben a relaciones heterosexuales, cerca del 30% por uso de drogas inyectadas y un poco menos del 20% a las relaciones homo/bisexuales. Las otras vías de transmisión: madre-hijo, transfusión sanguínea, relacionada con la hemofilia o los trastornos de coagulación sanguínea; representaron un 8%.

La proporción correspondiente a las tres principales categorías de transmisión ha evolucionado con relación a 1985, cuando sólo el 9% del total de casos nuevos se debía a relaciones heterosexuales, mientras que cerca del 60% de los casos nuevos se debían a relaciones homosexuales/bisexuales, y cerca del 15% al uso de drogas por vía intravenosa.

Con un 73% del conjunto de casos nuevos diagnosticados en 2003 en la UE25, los hombres siguen estando más afectados que las mujeres. Sin embargo, el incremento de la transmisión por vía heterosexual se traduce en un mayor número de mujeres entre 1985 y 2003. En 1985, sólo el 10% de los casos nuevos eran mujeres, frente a un 20% en 1995 y un 27% en 2003.

Vías de transmisión del SIDA en los casos diagnosticados

	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003
Hombres homo/bisexuales	59,7	37,3	28,4	22,6	20,0	19,9	19,1
Contactos heterosexuales	9,1	11,0	18,7	33,0	36,3	40,3	41,8
Usuarios de drogas inyectadas	15,5	40,6	43,3	34,2	33,0	30,2	30,7
Otros	15,7	11,0	9,6	10,3	10,8	9,7	8,4

(%), UE25*

* Sin Chipre y Malta. 2002 y 2003 también sin Países Bajos.
